

# Weitstrecke, Internationale Flüge 2021

## Zur Verabreichung über das Futter

Zugaben sind Tagesmengen für etwa 20 Tauben  
Alle Zugaben können über das morgendliche Futter gereicht werden  
oder auf beide Tagesmahlzeiten aufgeteilt werden.

## Tränke

Regeneration	<b>Heimkehr</b>	<b>Kräuterhefe</b> 10 ml <b>Jungtierpulver</b> 2 Messl.	<b>Multi-Elektrolyt-Mischung</b> 1 Messl. / 1 L
	<b>2. Tag</b>	<b>Kräuterhefe</b> 10 ml <b>Jungtierpulver</b> 2 Messl.	<b>Multi-Elektrolyt-Mischung</b> 1 Messl. / 1 L
	<b>3. Tag</b>	<b>Kräuterhefe</b> 10ml <b>Jungtierpulver</b> 2 Messl.	<b>Multi-Elektrolyt-Mischung</b> 1 Messl. / 1 L
	<b>4. - 6. Tag</b>	<b>Broncho-Fit</b> 10 ml <b>ENDO-FIT</b> 1 Messl. <b>Intestino®</b> 1 Messl.	<b>Fruchtsäure-Tonikum</b> 5 ml / 1 L
Formaufbau	<b>Zeitfenster zwischen zwei Wettflügen</b>	Aufgrund der langen Korbaufenthalte treten bei Weitstreckentauben deutlich häufiger Infektionen auf, als bei den RV-Programm-Tauben. Diese Infektionen können gut in der Pause zwischen zwei Flügen behandelt werden. Auch ohne Antibiotika kann die Darmgesundheit durch intensive Gabe des Intestino® wieder hergestellt werden. In jedem Fall aber dienen immer die ersten vier Tage der Regeneration und die letzten vier Tage dem Formaufbau. Gefüttert wird durchgängig eine gehaltvolle Reismischung, die den Anforderungen der Weitstrecke gerecht wird. In den letzten Tagen vor dem Einsatz sind Fettfutter-Zugaben sinnvoll.	
		<i>zwei Tage pro Woche</i> <b>Kräuterhefe</b> 10 ml <b>Haemo-Fit</b> 1 Messl.	<i>drei Tage pro Woche</i> <b>Fruchtsäure-Tonikum</b> 5 ml / 1 L
	<b>4. Tag vor</b>	<b>Kräuterhefe</b> 10 ml <b>Novo-Top</b> 1 Messl. <b>Intestino®</b> 1 Messl.	<b>Fruchtsäure-Tonikum</b> 5 ml / 1 L
	<b>3. Tag vor</b>	<b>Kräuterhefe</b> 10 ml <b>Novo-Top</b> 1 Messl. <b>Intestino®</b> 1 Messl.	Klares Wasser
	<b>2. Tag vor</b>	<b>Kräuterhefe</b> 10 ml <b>Novo-Top</b> 1 Messl. <b>Intestino®</b> 1 Messl.	Klares Wasser
<b>Einsatz</b>	keine Zusätze	Klares Wasser	

Von einem Weitstreckenflug heimkehrende Tauben erhalten an den ersten ein bis zwei Tagen nach der Heimkehr keinen Freiflug. Danach wird einige Tage lang der Freiflug ungezwungen gegeben. Erst wenn der Freiflug wieder gut ist, sollte zwei mal täglich am Haus trainiert werden. Dann wird das Training konsequent aufrecht erhalten bis der erneute Einsatz erfolgt.